

Przeciwwskazania

- Nie wstrzykiwać preparatu w okolicach oczodołów (powieka, obszar pod oczami, kurze łapki) i gładzizny.
- Nie należy wstrzykiwać preparat do naczyń krwionośnych (donaczyniowo),
- Wstrzyknięcie donaczyniowe może spowodować embolizację, niedrożność naczyń, niedokrwienie lub zawał.
- Nie dokonywać zbyt dużo poprawek.

Nie zaleca się stosowania preparatu:

- U pacjentów cierpiących na epilepsję, która nie jest leczona,
- U pacjentów ze skłonnością do wytwarzania blizn hipertroficzych,
- U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas hialuronowy,
- U pacjentów z nadwrażliwością na lidokainę lub miejscowe środki znieczulające typu amidowego,
- U pacjentów cierpiących na porfirię,
- U kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
- U dzieci.
- W miejscach, gdzie występują problemy skórne typu zapalenia i/lub infekcja (trądzik, opryszczka itp.)
- W bezpośrednim połączeniu z laseroterapią, głębokim peelingiem chemicznym lub dermabrazją.
- W przypadku peelingu powierzchniowego nie zaleca się wstrzykiwania, jeżeli wywołuje to reakcję zapalną o dużym nasileniu.