

Przeciwwskazania

Wypełniacza Infini Premium Filler nie należy stosować: do wstrzykiwania w okolicy oczu (powieki, worki pod oczami); do wstrzykiwania do naczyń krwionośnych; do powiększania biustu lub w przypadku implantów kości, ścięgien, więzadeł lub mięśni. Wypełniacza Infini Premium Filler nie wolno stosować u pacjentów: wcześniej lub aktualnie chorujących na choroby autoimmunologiczne lub aktualnie przyjmujących leki immunoterapeutyczne; ze stwierdzoną tendencją do powstawania blizn przerostowych lub bliznowców lub nieprawidłową pigmentacją; z poważnymi alergiami na różne czynniki; z zakażeniami i procesami zapalnymi w miejscu poddawanym zabiegowi lub w jego okolicy; z nieprawidłową koagulacją; ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas hialuronowy. Wypełniacza Infini Premium Filler nie wolno używać u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub u osób poniżej 18 roku życia.

Nie stosować

wypełniacza Infini Premium Filler w przypadku zaczerwienionej skóry, opuchlizny lub przebarwień; nie stosować wypełniacza Infini Premium Filler podczas stanów zapalnych, infekcji lub gorączki. U pacjentów przyjmujących leki spowalniające krzepnięcie krwi w miejscu wstrzyknięcia mogą pojawić się sińce lub może wystąpić znaczne krwawienie. Pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe powinni je odstawić, po konsultacji z lekarzem, przynajmniej 14 dni przed wstrzyknięciem wypełniacza Infini Premium Filler.

Reakcje niepożądane

Przed rozpoczęciem zabiegu lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o potencjalnych skutkach ubocznych związanych z implantacją śródskórną, jakie mogą wystąpić od razu lub po jakimś czasie. Po zastosowaniu wypełniacza Infini Premium Filler mogą wystąpić reakcje niepożądane związane z wstrzyknięciem, w tym ból, swędzenie, przebarwienia skóry i zagęszczenie tkanki, które zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu tygodnia. Czasami mogą powstawać obrzęki, które wchłaniają się w ciągu kilku dni. Do reakcji niepożądanych związanych z zastosowaniem produktu, biorąc pod uwagę przegląd literatury na ten temat oraz wiedzę naukową producenta na dzień sporządzenia tej ulotki, należą między innymi: reakcje zapalne, świąd, ból przy dotyku po wstrzyknięciu utrzymujący się najwyżej do tygodnia czasu; w rzadkich przypadkach krwawienie lub krwiak; pęcherzykowate grudki - krostki, które mogą powstawać do 4 tygodni po zabiegu; reakcje alergiczne na kwas hialuronowy; stwardnienie lub pojawienie się guzków w miejscu wstrzyknięcia; w bardzo rzadkich przypadkach, ziarniniaki lub znaczne reakcje zapalne, bąble, martwica, pokrzywka, które mogą pojawić się nawet po 2-4 tygodniach.

WAŻNE: pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich poważnych niepożądanych reakcjach, które nie zostały wymienione w tej ulotce, a lekarz, oprócz

zalecenia odpowiedniego leczenia takich reakcji, ma obowiązek powiadomić o nich dystrybutora INFINI LAB SRL oraz producenta VIDA SRL.