

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie wstrzykiwać produktu CUTEGEL w okolice oczu (koło pod oczami lub powieki).  
Nie wstrzykiwać produktu CUTEGEL do naczyń krwionośnych (donaczyniowo).

CUTEGEL nie może być stosowany w:

kobiety w ciąży lub karmiące piersią osoby poniżej 21 roku życia pacjenci, u których stwierdzono nadwrażliwość na kwas hialuronowy pacjenci z tendencją do powstawania blizn przerostowych.

CUTEGEL nie może być stosowany w połączeniu z laseroterapią, chemią peeling lub dermabrazją.

Produktu CUTEGEL nie wolno stosować w miejscach, w których występują stany zapalne skóry i procesy zakaźne.

## ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

Lekarze muszą poinformować pacjentów o potencjalnych zdarzeniach niepożądanych, które:

mogą wystąpić lub być opóźnione bezpośrednio po wstrzyknięciu,

Te zdarzenia niepożądane obejmują między innymi:

Mogą wystąpić reakcje zapalne, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i tkliwość wystąpić w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te mogą trwać do dwóch tygodni,

Guzki lub stwardnienie są również możliwe w miejscu wstrzyknięcia, krwiaki.

Barwienie lub odbarwienie miejsca wstrzyknięcia,

Słaby efekt lub słaby efekt wypełnienia.

Przypadki martwicy gładziny czoła, tworzenia ropni, ziarniniaka i natychmiastowego lub opóźnioną nadwrażliwość opisano w piśmiennictwie po:

wstrzyknięcie kwasu hialuronowego. Dlatego ważne jest, aby wziąć takie możliwe pod uwagę komplikacje.

Pacjenci muszą zgłaszać reakcje zapalne, które utrzymują się dłużej niż jeden raz tydzień lub jakikolwiek inny efekt wtórny, który rozwija się u ich praktykującego tak szybko, jak to możliwe. Biegły rewident powinien traktować je odpowiednio. Wszelkie inne niepożądane skutki uboczne związane z wstrzyknięciem CUTEGEL należy zgłosić dystrybutorowi i/lub producentowi.