

Główne przeciwwskazania do jego stosowania:

Przeciwwskazania ogólne:

1. **Ciąża i karmienie piersią** – brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania u kobiet ciężarnych i karmiących.
2. **Choroby autoimmunologiczne** – np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, z uwagi na możliwość nieprzewidywalnej odpowiedzi układu odpornościowego.
3. **Alergia na składniki preparatu** – nadwrażliwość na kwas polimlekowy lub inne składniki preparatu.
4. **Infekcje** – miejscowe infekcje skórne (np. opryszczka, trądzik ropowiczy) lub ogólnoustrojowe (np. grypa, infekcja wirusowa).
5. **Choroby nowotworowe** – zarówno aktywne, jak i niedawno leczone.
6. **Stany zapalne skóry** – w miejscu planowanego podania.

Przeciwwskazania miejscowe:

1. **Uszkodzenia skóry** – np. rany, owrzodzenia, blizny przerostowe w miejscu planowanego zabiegu.
2. **Skłonność do bliznowacenia** – szczególnie bliznowacenie przerostowe lub keloidy.
3. **Aktywne choroby skóry** – np. łuszczyca, egzema, trądzik aktywny w okolicy zabiegu.
4. **Obecność implantów w obszarze zabiegowym** – np. implanty silikonowe lub inne obce ciała w obszarze planowanego podania.

Przeciwwskazania proceduralne:

1. **Stosowanie w obszarach przeciwwskazanych** – np. okolice wrażliwe, takie jak powieki czy czerwień wargowa.
2. **Terapie łączone** – zabieg nie powinien być wykonywany równocześnie z innymi inwazyjnymi procedurami w tym samym miejscu (np. wypełniacze HA, lasery, mezoterapia mikroigłowa), jeśli czas rekonwalescencji jest niewystarczający.

Zalecenia:

Przed przystąpieniem do zabiegu z użyciem AesPLLa 365 mg konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu zdrowotnego i oceny skóry pacjenta.

Jeśli występują jakiegokolwiek wątpliwości co do przeciwwskazań, zaleca się konsultację z lekarzem specjalistą.